


Инфекции передаваемые половым путем

Врач: Кузнецова Светлана Георгиевна
Медицинская сестра: Белоброва Дарья Дмитриевна

Какие инфекции передаются половым путем ?

- Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем (ИППП) – это группа инфекционных заболеваний, которые передаются в основном посредством полового контакта от больного человека к здоровому. К ИППП относят сифилис, гонорею, хламидийную и микоплазменную инфекцию, трихомониаз, герпетическую и папилломавирусную инфекцию половых органов.



Помимо этого, половым путем передается такая инфекция, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание, называемое СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита). ВИЧ-инфекция – это хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, которое поражает клетки иммунной системы. В результате ее работа угнетается, организм больного теряет возможность защищаться от разнообразных бактериальных, грибковых и вирусных заболеваний, а также препятствовать развитию злокачественных опухолей (рака), что через некоторое время ведет к смерти больного. Так же при половых контактах помимо ИППП, ВИЧ-инфекции передаются вирусные гепатиты В и С, а также некоторые другие заболевания (чесотка, лобковые вши, контагиозный моллюск). На сегодняшний день известно 30 заболеваний, которые могут передаваться половым путем





Распространенность ИППП и ВИЧ-инфекции

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире более 340 миллионов мужчин и женщин в возрасте 15—49 лет заболевают ИППП, на земном шаре каждый шестой житель страдает какой-либо болезнью, передаваемой половым путем.

Взаимосвязь распространения ИППП и ВИЧ-инфекции

Некоторое время вопросы ВИЧ и ИППП рассматривались независимо друг от друга. В действительности же между распространением ВИЧ-инфекции и ИППП существует объективная взаимосвязь. Наличие у человека какой-либо ИППП в среднем в 3-4 и даже более раз увеличивает риск заражения ВИЧ. Особенно риск возрастает при наличии одновременно нескольких ИППП. Имеющиеся нарушения целостности слизистых половых органов в результате инфицирования ИППП являются открытыми входными воротами для вируса иммунодефицита. Практикуя половые контакты без средств индивидуальной защиты, от одного и того же партнера одновременно можно заразиться несколькими инфекциями в том числе и ВИЧ.

При незащищенных половых контактах

Без использования презерватива



Практикуя половые контакты без средств индивидуальной защиты, от одного и того же партнера одновременно можно заразиться несколькими инфекциями в том числе и ВИЧ.

*Все инфекции, которые могут передаваться
при половых контактах, условно можно
разделить на*

Излечимые



- Гонорея
- Сифилис
- Трихомониаз

Неизлечимые



- ВИЧ-инфекция,
герпес половых
органов


При несвоевременной диагностике или неадекватной терапии ИППП могут приобретать хроническое течение и стать в последствии причиной поражения других органов и систем: суставов при хламидиозе, сердечно-сосудистой и нервной системы при сифилисе, вызвать онкологические заболевания (рак шейки матки при заражении вирусами папилломы), а при ВИЧ-инфекции - привести к летальному исходу.



Если ИППП были обнаружены у одного из половых партнеров, оба партнера должны пройти обязательный курс лечения

Источник заражения и пути распространения ИППП и ВИЧ инфекции

Основным источником заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией является больной человек. Животные этими болезнями не болеют. Однако нередко источником может быть внешне здоровый человек — носитель инфекции. Путь передачи преимущественно половой.



Следует понимать, что заразиться ИППП и ВИЧ-инфекцией нельзя при



Рукопожатиях



Объятиях, дружеском поцелуе




Укусах насекомых




Использование питьевого
фонтанчика



Через Воду в бассейне
или водоёме




Поручни в общественном транспорте



Через пищевые продукты

Профилактика ИППП и ВИЧ-инфекции

○ Зависит от внутренних моральных установок (ориентации на более позднее начало половой жизни; Отказ от добрачных и внебрачных интимных отношений).



Безопасное сексуальное поведение включает в себя:

- Отказ от раннего начала половой жизни
- Исключение случайных половых связей
- Сокращение числа половых партнеров и выбор одного наиболее надежного
- Использование средств индивидуальной профилактики ИППП и ВИЧинфекции (презерватив)
- В случае подозрения на ИППП, случайном половом контакте с сомнительным партнером нужно незамедлительное обращение в лечебное учреждение

Спасибо за внимание!

