



Тема: «Клещевой энцефалит и его профилактика»



Подготовил: Врач невролог КДЦ АО «АК «ЖДЯ» Воеводина
Людмила Васильевна



Что такое КЛЕЩ?

Клещ - это небольшое членистоногое животное из класса паукообразных, паразитирующее на теле животных и человека, а также на растениях.





ПЕРЕНОСЧИК ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КАК:

Энцефали

Тиф **Лихорадка**

Чума

Туляремия

The background of the slide is a lush, green spring landscape. In the top left, there are branches with bright green, serrated leaves, some of which have small white starburst light effects. A dark brown tree trunk is visible on the left side. In the bottom left, there is a patch of green grass. On the right side, there is a climbing vine with small green leaves and several bright yellow flowers. The overall scene is bright and sunny, with a soft, out-of-focus background.

Клещевой энцефалит

Это инфекционное заболевание, в основе которого лежит повреждение головного и спинного мозга.



**Основные признаки признаки
клещевого энцефалита:** слабость,
тяжесть в голове, головные боли,
повышение температуры тела до 38-
39 °С, боли в мышцах и суставах,
тошнота, рвота и нарушение
координации.





Пути заражения

Заражение происходит при нападении клещей на людей в пригородной зоне, полях, лесах, дачных участках во время отдыха, сбора грибов. Нередко случаи заражения регистрируются и в самих городах: в парковых зонах, области газонов. Возможен механический перенос клещей на одежде, вещах, продуктах и их переползание на людей, не бывающих на природе.

Как происходит заражение

Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время не замечен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелиоз.



Как предотвратить присасывание клещей

Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства индивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса или на прогулке одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 15 минут пребывания на прогулке проводить само- и взаимно осмотры верхней одежды и открытых частей тела.



Как удалить присосавшегося клеща?

- 1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут**
- 2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.**
- 3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.**
- 4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.**



5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для лечебной помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как занозу.

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.

7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.

8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию.



ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА - ВОВРЕМЯ!

1

ПЕРВАЯ ПРИВИВКА
ОКТАБРЬ - НОЯБРЬ

2

ВТОРАЯ ПРИВИВКА
СПУСТЯ 5-7 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ

3

ТРЕТЬЯ ПРИВИВКА
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ПРИВИВКИ

4

ЧЕТВЕРТАЯ ПРИВИВКА
КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА



egon.rospotrebnadzor.ru

* Главная защита от заболевания клещевым энцефалитом - это вакцинация

Вакцинация против клещевого энцефалита признана одним из наиболее надежных методов защиты. Вакцина помогает организму выработать иммунитет к вирусу еще до возможного заражения.

Вакцинировать можно всех, кроме детей младше одного года, беременных и кормящих женщин. Процедура проводится только после осмотра и одобрения врача, так как имеет определённые противопоказания.



Лучшая защита от укуса клещей – это соблюдение техники безопасности:

- 1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.**
- 2. Перемещаясь по участку, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей.**
- 3. Ноги должны быть полностью прикрыты.**
- 4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.**
- 5. Обязательно наличие головного убора.**
- 6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.**
- 7. После прогулки, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье.**
- 8. Осмотреть все тело.**
- 9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

